

	 The miracles of science™	<b>ACCENT® 75 WG</b> FICHA TÉCNICA	Página: Revisão: Data da revisão:	1 de 2 0 06.2016
---	---	---------------------------------------	---	------------------------

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

### FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 75% (p/p) de nicosulfurão

### CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **ACCENT® 75 WG** é um herbicida sistémico e com alguma acção residual, absorvido pelas folhas e, em parte pelas raízes, do grupo químico das sulfonilureias. O seu modo de acção tem por base a inibição da enzima acetolactato-sintetase (ALS) com a consequente paragem do crescimento por inibição da divisão celular. Os sintomas (cloroses/necroses) tornam-se visíveis cerca de duas semanas após a aplicação do herbicida.

### FINALIDADES

O **ACCENT® 75 WG** é indicado para aplicação em pós-emergência da cultura do milho, para o combate a infestantes anuais, gramíneas e dicotiledóneas.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

### ÉPOCA, DOSES E CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Aplicar o **ACCENT® 75 WG** em pós-emergência, quando a cultura se apresenta com 2-4 folhas verdadeiras e as infestantes não ultrapassam 2-5 folhas.

**DOSE:** 53 a 80 g/ha. Usar as doses mais elevadas em solos pesados, ricos em matéria orgânica e/ou presença de forte infestação.

Na altura de aplicação do herbicida, o solo deve estar bem preparado e com suficiente humidade à superfície; se necessário, deve efectuar-se uma rega (não intensa nas 12 horas após a aplicação), a não ser que chova o suficiente nos 10 dias seguintes à aplicação. Não se deve mobilizar o solo após a aplicação.

### PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- A aplicação repetida do herbicida ou de herbicidas com o mesmo modo de acção pode originar o aparecimento de biótipos resistentes de algumas infestantes indicadas no rótulo como susceptíveis. Para evitar que tal aconteça, recomenda-se proceder à rotação de culturas sempre que possível, e não aplicar o **ACCENT® 75 WG** mais do que 3 anos consecutivos nos mesmos solos. De preferência proceder à alternância com outros herbicidas apresentando distinto modo de acção.
- Não misturar o herbicida com adubos líquidos.
- Não aplicar em milho-doce, milho para pipocas ou milho para multiplicação.
- Não se pode semear colza depois de uma cultura de milho tratada com **ACCENT® 75 WG**. Após a aplicação de **ACCENT® 75 WG**, recomendam-se os seguintes intervalos relativamente a culturas seguintes: cereais de Inverno – 4 meses; cereais de Primavera – 8 meses; outras culturas – 10 meses. Durante a aplicação não atingir as culturas e os terrenos vizinhos da área a tratar. Não aplicar o herbicida com temperaturas do ar superiores a 25°C nem inferiores a 10°C. Não aplicar em culturas, previamente tratadas, com insecticidas organofosforados sistémicos.
- Não aplicar **ACCENT® 75 WG** quando se prevê a ocorrência de precipitação nas 3 horas seguintes à aplicação. É conveniente que não se efectue uma rega intensa nas 12 horas após a aplicação.

### INFESTANTES SUSCEPTÍVEIS

Bredos - *Amaranthus* spp.; Saramago - *Raphanus raphanistrum*; Cabelo-de-cão - *Poa annua*; Milhã-verde - *Setaria viridis*; Pega-saias - *Setaria verticillata*; Milhã-amarelada - *Setaria pumila*; Milha-pé-de-galo - *Echinochloa crus-galli*; Sorgo-bravo - *Sorghum halepense*; Milhã-digitada - *Digitaria sanguinalis*

	 The miracles of science™	<b>ACCENT® 75 WG</b> <b>FICHA TÉCNICA</b>	Página: Revisão: Data da revisão:	2 de 2 0 06.2016
---	---	--	---	------------------------

## INFESTANTES RESISTENTES

Mal-casada - *Polygonum lapathifolium*; Erva-pessegueira - *Polygonum persicaria*; Quenopódios - *Chenopodium* spp.; Figueira-do-inferno - *Datura stramonium*; Junça-de-conta - *Cyperus rotundus*; Juncinha - *Cyperus esculentus*; Erva-moira - *Solanum nigrum*; Labaça-crespa - *Rumex crispus*; Corriola - *Convolvulus arvensis*; Graminhão - *Paspalum paspalodes*; Beldroega - *Portulaca oleracea*; Cardo-das-vinhas - *Cirsium arvense*.

## INFORMAÇÕES IMPORTANTES

### PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Não respirar a nuvem de pulverização
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem
- Nocivo para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Para protecção de plantas não visadas, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
- Tratamento de emergência – Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

### INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de Segurança: -

### CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

Isento

### AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização provisória de venda n.º 0229, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

### EMBALAGENS

200g; 4kg.

### DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



DuPont Portugal, S.A.  
Estrada Nacional 240, Km 14  
Apartado 24  
2726-902 Mem Martins

### DISTRIBUÍDO POR:



Genyen – Grow and Protect, S.A.  
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda  
1349-017 Lisboa  
[www.genyen.pt](http://www.genyen.pt)

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.