

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Pó molhável (WP) com 35% (p/p) de fosetil-Alumínio e 35% (p/p) de mancozebe.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **KATANGA® DUPLO** é um fungicida sistémico, com mobilidade ascendente e descendente (sistemia completa), contendo fosetil de alumínio, inibidor do metabolismo fosfatado. Exerce a sua acção por via directa, por inibição do crescimento do micélio e da formação de esporos e por via indirecta, por estimulação das defesas naturais da planta. Contém mancozebe, fungicida de superfície que actua através da inibição da germinação dos esporos.

Tratando-se de um fungicida com acção essencialmente preventiva, deve ser sempre aplicado antes da instalação da doença. Apresenta uma persistência de acção de 12-14 dias.

FINALIDADES

O **KATANGA® DUPLO** é um fungicida sistémico indicado no combate ao míldio da videira (*Plasmopara viticola*).

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES/DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURAS	DOENÇAS	CONCENTRAÇÕES (g/hl)	OBSERVAÇÕES
Videira	Míldio (<i>Plasmopara viticola</i>)	400 g/hl	Realizar os tratamentos de acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas. Na falta deste, fazer o 1º tratamento no estado de 7-8 folhas. Os tratamentos seguintes deverão ser realizados quando as condições climáticas favorecerem o desenvolvimento da doença, a intervalos de 10-14 dias. Realizar no máximo 2 aplicações.

EXTENSÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÕES MENORES

Concedida extensão de autorização de utilização menor para aplicação em castanheiro para combate a septoriose do castanheiro:

- **CASTANHEIRO - Septoriose do castanheiro** (*Mycosphaerella maculiformis*) - **400 g/hl** (dose: 2,8 kg/ha)
Tratar por pulverização em condições favoráveis ao desenvolvimento da doença. Efectuar no máximo 2 aplicações por ciclo cultural. Respeitar um intervalo de 10 a 14 dias entre aplicações. Volume de calda: 700 l/ha. Intervalo de Segurança: 44 dias.

Advertência: A eficácia e eventual fitotoxicidade resultantes desta utilização menor são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Em caso de necessidade, alternar o uso com produtos de diferentes modos de acção.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

INCOMPATIBILIDADES

O **KATANGA® DUPLO** é incompatível com produtos à base de dicofol, dinocape, óleos minerais, cobre e adubos foliares.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS


- Este produto destina-se a ser utilizado por agricultores e outros aplicadores de produtos fitofarmacêuticos.
- Para evitar riscos para os seres vivos e para o ambiente respeitar as instruções de utilização.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Irritante para os olhos

- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Suspeito de afectar o nascituro.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Usar o equipamento de protecção individual exigido.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Recolher o produto derramado
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos
- EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.
- -Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 20 m.
- -Para protecção dos artrópodos não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas circunvizinhas.
- -Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objectos contaminados tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
- - Intervalo de Segurança -28 dias em videira
- -Não ultrapassar o número máximo de aplicações indicado para a cultura em causa, com esta substância ativa ou outra do grupo de ditiocarbamatos (metirame, propinebe, tirame, zirame)
- -Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado.
- - Tratamento de emergência – Em caso de contacto com os olhos, lavar imediata e abundantemente com água e consultar um especialista. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de Segurança: 28 dias em videira; 44 dias em castanheiro (extensão de autorização para utilização menor).

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



ATENÇÃO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 0609, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

400g; 5kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



C/ Valle del Roncal, 12
28232 Las Rozas, Madrid

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
