

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

O **RATRAX® PASTA** é um rodenticida anticoagulante composto por 0,005%(p/p) de difenacume, pronto a usar, sob a forma de pasta (vermelho) e destinado ao uso não profissional.

A sua utilização está indicada no combate a ratos e ratazanas, em interiores e exteriores, em torno de edifícios de habitação, industriais, comerciais e institucionais. Não usar em esgotos.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Coloque os pontos de engodo em locais onde existam sinais de actividade de roedores, como excrementos frescos, no interior ou próximo de ninhos e tocas, em caminhos e locais de alimentação dos roedores. Espalhar os pontos de engodo pela área infestada.

Praga-alvo	Nível de infestação	Pontos de engodo	Recomendações	
Ratazanas	Baixo	Até 20 saquetas por cada 5 a 10 metros	Realizar inspecções frequentes aos pontos de engodo durante os primeiros 10-14 dias, reabastecendo qualquer isco consumido pelos roedores ou que tenha sofrido deterioração pela água ou sido contaminado por poeiras.	Não mover ou perturbar os pontos de engodo durante vários dias após a colocação do isco. Se não forem observados sinais da actividade das ratazanas após 7-10 dias, deslocar o ponto de engodo para uma zona com maior actividade de ratazanas.
	Elevado	Até 20 saquetas por cada 2 a 5 metros		
Ratos	Baixo	Até 4 saquetas por cada 5 metros		Os ratos são muito inquisitivos, pelo que a deslocação dos pontos de engodo a cada 2-3 dias quando estes forem inspecionados/abertos, poderá ajudar o programa de controlo.
	Elevado	Até 4 saquetas por cada 2 metros		

Contra ratos, está autorizada a utilização de estações de isco seguras disponíveis no mercado (previamente carregadas ou recarregáveis) ou pontos de isco cobertos/protegidos.

Contra ratazanas, apenas está autorizada a utilização de estações de isco resistentes e seguras (previamente carregadas ou recarregáveis) disponíveis no mercado.

Caso todos os iscos tenham sido consumidos em determinadas áreas, deve aumentar-se a quantidade de isco através da colocação de mais pontos de engodo. Não se deve aumentar a quantidade de isco de um ponto de engodo.

Reabastecer o isco que tenha sido consumido pelos roedores ou que tenha sofrido deterioração pela água ou que tenha sido contaminado por poeiras.

Procurar e remover os roedores mortos a intervalos regulares durante o tratamento, pelo menos tão frequentemente quanto a inspecção e/ou reabastecimento de iscos. Inspeções diárias podem ser necessárias nalgumas circunstâncias.

Utilização em zonas públicas:

Quando o produto está a ser utilizado em zonas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deverão ser disponibilizados avisos junto dos iscos, explicando o risco de envenenamentos primário e secundário por anticoagulante bem como a indicação das medidas de primeiros socorros a tomar em caso de envenenamento.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Prováveis efeitos adversos e instruções de primeiros socorros:

Difenacume é um anticoagulante que pode causar hemorragia. Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo do produto.

Antídoto: Vitamina K (sob supervisão médica). Os profissionais de saúde deverão contactar o Centro de Informação Anti-Venenos (CIAV) do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) através do número de telefone 808 250 143.

Precauções e condições especiais de autorização:

- Guardar fechado à chave e fora do alcance das crianças.
- Manter afastado de alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rótulo.
- Evitar qualquer contacto com a boca.
- Lavar as mãos e zonas expostas da pele antes das refeições e depois de manusear o produto.
- Prevenir o acesso ao isco por parte de crianças, aves e animais não visados (particularmente cães, gatos, porcos e aves de produção).
- Para utilização apenas em áreas inacessíveis a crianças, animais de companhia e animais não visados.
- Para utilização em interiores e exteriores (apenas em torno de edifícios de habitação, industriais, comerciais e institucionais). Não usar em esgotos.
- As estações de isco deverão ser marcadas de forma clara de modo a evidenciar que contêm rodenticidas e que não deverão ser mexidas.
- Sempre que possível, as estações de isco ou pontos de engodo deverão ser fixados de modo a que não sejam arrastados.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

Isento de classificação.

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda **PT/DGS ARMPB-011/2012**, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde)

EMBALAGENS

200 g; 1 Kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



International

Unit 13 Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele apresentadas.