

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 500 g/kg ou 50% (p/p) de iprodiona.

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **SABUESO®** é um fungicida de contacto à base de iprodiona, pertencente ao grupo das dicarboximidas. Apresenta actividade preventiva e curativa e actua por inibição da transmissão dos primeiros sinais celulares, actuando no sinal de transmissão osmótica da histidinaquinase.

FINALIDADES

O **SABUESO®** é recomendado para controlar a podridão cinzenta (*Botrytis cinerea*) em videira e tomateiro em estufa.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CULTURAS / INIMIGO	DOSES (kg/ha)	VOLUME DE ÁGUA (L/ha)	ÉPOCA DE APLICAÇÃO
Vinha			
Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	1 - 1.5 (200-500g/hl)	300 - 500	Efectuar a 1ª aplicação no início do fecho dos cachos (BBCH 77) e a 2ª do início do "pintor" ao amadurecimento dos bagos (BBCH 83-85). A persistência de acção é de 15 dias.
Tomateiro (estufa)			
Podridão cinzenta (<i>Botrytis cinerea</i>)	1.5 - 2 (125-250g/hl)	800 - 1200	Iniciar as aplicações após a floração. Efectuar no máximo 3 aplicações, enquanto as condições forem favoráveis à doença. A persistência biológica do produto é de 15 dias.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Para evitar o desenvolvimento de resistências, não realizar com este produto ou qualquer outro que contenha dicarboximidas, mais de 2 aplicações em videira e 3 aplicações em tomateiro, não excedendo metade do número de tratamentos anti-botritis.
- Alternar com fungicidas com diferente modo de acção.
- Não aplicar o produto nos locais onde se verifiquem quebras de eficácia após aplicação repetida do mesmo ou de outros produtos com o mesmo modo de acção (dicarboximidas).

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Possibilidade de efeitos cancerígenos.
- Não respirar as poeiras nem a nuvem de pulverização.
- Evitar o contacto com os olhos.
- Usar vestuário de protecção e luvas adequadas durante a preparação da calda e aplicação do produto.

- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada em relação às águas de superfície de 10 metros em videira e 20 metros em tomateiro.
- Após o tratamento lavar bem o material de protecção e os objectos contaminados tendo cuidado especial em lavar as luvas por dentro.
- Impedir o acesso a pessoas às áreas tratadas até à secagem do pulverizado, ou usar luvas e vestuário de protecção adequado.
- Tratamento de emergência - Em caso de ingestão, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem e o rótulo.

INTERVALO DE SEGURANÇA

Intervalo de Segurança: 3 dias em tomateiro (em estufa); 21 dias em videira.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



NOCIVO



PERIGOSO PARA
O AMBIENTE

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 0315, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

150g; 1kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



C/ Valle del Roncal, 12
28232 Las Rozas, Madrid

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen - Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa - Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
