

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 2,5% (p/p) de lambda-cialotrina

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **ASCOT®** é um insecticida piretróide, à base de lambda-cialotrina, não sistémico, com acção de contacto e ingestão. Actua sobre o sistema nervoso dos insectos, como modulador dos canais de sódio.

Apresenta um elevado efeito de choque e boa persistência de acção, mostrando-se eficaz no combate a diversas pragas agrícolas.

FINALIDADES

O **ASCOT®**, insecticida pertencente ao grupo dos piretróides, apresenta um largo espectro de acção e está indicado no controlo de afídeos e mosca-do-Mediterrâneo em pessegueiro, e escaravelho-da-batateira e afídeos na cultura da batateira.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

DOSES E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

ASCOT® está indicado no combate a pragas em culturas agrícolas, de acordo com as seguintes condições:

CULTURAS	PRAGAS	DOSES (kg/ha)	VOLUME DE ÁGUA (l/ha)	APLICAÇÕES
Pessegueiro	afídeos (<i>Myzus persicae</i>)	0,4 – 0,8	800 - 1200	2 aplicações no máximo. Intervalo mínimo entre: 15 dias.
	mosca do Mediterrâneo (<i>Ceratitis capitata</i>)			
Batateira	Afídeos (<i>Aphis</i> spp. e <i>Myzus persicae</i>)	0,4 – 0,8	800 - 1200	2 aplicações no máximo. Intervalo mínimo entre: 15 dias.
	Escaravelho da batateira (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)			

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

- Não efectuar mais de duas aplicações por ciclo cultural. As aplicações devem ser alternadas, com produtos de diferentes modos de acção, de forma a evitar o desenvolvimento de fenómenos de resistência.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Manter afastado dos alimentos e bebidas, incluindo os dos animais.
- Nocivo por ingestão.
- Evitar o contacto com a pele
- Não respirar a nuvem de pulverização.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.

- Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático.
- Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície, nas culturas da batateira e em pessegueiro.
- Perigoso para as abelhas. Para protecção das abelhas e de outros insectos polinizadores, não aplicar este insecticida durante o período de presença das abelhas nos campos. Não aplicar este produto durante a floração das culturas ou na presença de infestantes em floração
- Tratamento de emergência – Em caso de acidente ou indisposição, consultar imediatamente o médico (se possível mostrar-lhe o rótulo).

INTERVALO DE SEGURANÇA

INTERVALO DE SEGURANÇA: 7 dias em batateira e em pessegueiro.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO



NOCIVO



PERIGOSO PARA O AMBIENTE

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 0409, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

250g; 1kg.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



C/ Valle del Roncal, 12
28232 Las Rozas, Madrid

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.
