

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

O **RATRAX® MAGNUM PASTA** é um rodenticida anticoagulante (biocida - TP14), composto por 0,0025%(p/p) de bromadiolona e 0,001% (p/p) de benzoato de denatónio, pronto a usar, sob a forma de pasta (vermelho) e destinado ao uso profissional.

Rodenticida para utilização em estações de isco invioláveis e rotuladas, no controlo de *Rattus norvegicus* (ratazana-castanha ou ratazana-comum ou ratazana-castanha ou ratazana-dos-esgotos), adultos e juvenis, e no controlo de *Mus musculus* (rato-caseiro ou rato-doméstico), adultos e juvenis, por utilizadores profissionais, em áreas interiores de edifícios, em áreas exteriores (ao redor de edifícios) ou em esgotos.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Utilização em áreas interiores e utilização em áreas exteriores ao redor de edifícios

DOSAGEM:

#### Ratos

Infestações elevadas - até 40g de isco por estação ou ponto de isco a cada 2 metros; Infestações ligeiras - até 40g de isco por estação ou ponto de isco a cada 5 metros.

#### Ratazanas

Infestações elevadas - até 200g de isco por estação ou ponto de isco a cada 5 metros; Infestações ligeiras: até 200g de isco por estação ou ponto de isco a cada 10 metros.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- Isco pronto-a-usar para utilização em estações de isco invioláveis.
- Estações de isco cobertas e protegidas.
- Aplicação directa em tocas do isco pronto-a-usar (áreas exteriores em redor de edifícios).

Utilização em esgotos

DOSAGEM:

#### Ratazanas

Até 200g de isco por bueiro;

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

- Isco pronto-a-usar para utilização em estações de isco que impeçam o isco de contactar com águas residuais.
- Estações de isco cobertas e protegidas.

### Utilização em zonas públicas:

Quando o produto está a ser utilizado em zonas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deverão ser disponibilizados avisos junto dos iscos, explicando o risco de envenenamentos primário e secundário por anticoagulante bem como a indicação das medidas de primeiros socorros a tomar em caso de envenenamento.

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

### Efeitos directos ou indirectos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

#### GERAIS

- Este produto contém uma substância anticoagulante. Se for ingerido, os sintomas, que podem ser tardios, podem incluir hemorragia nasal ou gengival. Nos casos graves, podem formar-se hematomas e estar presente sangue nas fezes e urina.
- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por médicos/médicos veterinários.
- Em caso de:
  - Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
  - Exposição ocular, lavar os olhos com líquido de limpeza ocular ou com água, durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas.
  - Exposição oral, lavar a boca cuidadosamente com água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar de imediato cuidados médicos e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.
- Perigoso para espécies selvagens.

#### ESPECÍFICAS

Utilização em áreas interiores e em áreas exteriores ao redor de edifícios

- Aquando da aplicação de pontos de isco junto a canalizações e sistemas de drenagem de água, assegurar que o contacto do isco com a água é evitado.

**Outras informações**

- Devido ao seu modo de acção prolongado, os rodenticidas anticoagulantes demoram entre 4 e 10 dias a ser eficazes uma vez ingerido o isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos sem ter as mãos protegidas, usar luvas ou dispositivos como pinças para os manusear.
- Este produto contém um agente amargante e um corante.
- Use os biocidas em segurança.
- É ilegal utilizar este produto para usos ou de maneira diferente da prescrita no rótulo.

**Precauções e condições especiais de autorização:**

- Pode afectar os órgãos sangue após exposição prolongada ou repetida.
- Manter afastado da roupa e de outras matérias combustíveis.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Armazenar em recipiente fechado.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Eliminar o conteúdo em concordância com a regulamentação nacional.
- Usar luvas de protecção.
- Em caso de indisposição, consulte um médico.

**EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Tel.: 800 250 250**

**ELEMENTOS DO RÓTULO**



**PERIGO**

**AUTORIZAÇÃO DE VENDA**

Autorização de venda **PT/DGS mrs011/2020**, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde)

**EMBALAGENS**

3, 5, 10, 20 Kg

**DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:**



18 rue des Remparts d'Ainay  
 69002 Lyon FRANÇA  
 Tel. 01420 80744

**DISTRIBUÍDO POR:**



Genyen – Grow and Protect, S.A.  
 Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda  
 1349-017 Lisboa  
 Tel.: +351 211 581 669  
[www.genyen.pt](http://www.genyen.pt)

**As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito por todas as indicações e recomendações, bem como pelas condições de aplicação nele apresentadas.**