

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

O **RATRAX® MAGNUM PASTA** é um rodenticida anticoagulante (biocida - TP14), composto por 0,0025%(p/p) de bromadiolona e 0,001% (p/p) de benzoato de denatónio, pronto a usar, sob a forma de pasta (vermelho) e destinado à utilização pelo público em geral (uso não profissional).

Rodenticida para utilização em estações de isco invioláveis e rotuladas, no controlo de *Rattus norvegicus* (ratazana-castanha ou ratazana-comum ou ratazana-dos-esgotos), adultos e juvenis, e no controlo de *Mus musculus* (rato-caseiro ou rato-doméstico), adultos e juvenis, por utilizadores não profissionais, em áreas interiores de edifícios e em áreas exteriores (junto de edifícios).

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Contra rato-caseiro, em interior, usar até 40g de isco por estação de isco. Se for necessário mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 2 a 5 metros.

Contra ratazana, em interior e exterior, junto de edifícios, usar até 200g de isco por estação de isco. Se for necessário mais do que uma estação de isco, a distância mínima entre as estações deve ser de 5 a 10 metros.

MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Contra rato-caseiro

Utilização em Interior

- As estações de isco devem ser observadas a cada 2 a 3 dias no início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações se encontram intactas e para remover roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco, sempre que necessário.

Contra ratazana

Utilização no Exterior junto de edifícios

- Colocar as estações de isco em áreas não sujeitas a inundação.
- Substituir qualquer isco em pontos de isco em que este tenha sido danificado pela água ou contaminado por sujidade.
- As estações de isco devem ser observadas 5 a 7 dias depois do início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações estão intactas e para remoção de roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco, sempre que necessário.

Utilização em Interior

- As estações de isco devem ser observadas 5 a 7 dias depois do início do tratamento e pelo menos semanalmente em fases posteriores, de modo a verificar se o isco é aceite, se as estações estão intactas e para remoção de roedores mortos. Deve ser feito carregamento de isco, sempre que necessário.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Efeitos directos ou indirectos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Este produto contém uma substância anticoagulante. Se for ingerido, os sintomas, que podem ser tardios, podem incluir hemorragia nasal ou gengival. Nos casos graves, podem formar-se hematomas e estar presente sangue nas fezes e urina.
- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por médicos/médicos veterinários.
- Em caso de:
 - Exposição cutânea, lavar a pele com água e depois com água e sabão.
 - Exposição ocular, lavar os olhos com líquido de limpeza ocular ou com água, durante pelo menos 10 minutos, mantendo as pálpebras abertas.
 - Exposição oral, lavar a boca cuidadosamente com água. Nunca administrar nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Em caso de ingestão, procurar de imediato cuidados médicos e mostrar a embalagem ou o rótulo do produto.
- Perigoso para espécies selvagens.

Outras informações

- Devido ao seu modo de acção prolongado, os rodenticidas anticoagulantes demoram entre 4 e 10 dias a ser eficazes uma vez ingerido o isco.

- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos sem ter as mãos protegidas, usar luvas ou dispositivos como pinças para os manusear.
- Este produto contém um agente amargante e um corante.
- Use os biocidas em segurança.
- É ilegal utilizar este produto para usos ou de maneira diferente da prescrita no rótulo.

Precauções e condições especiais de autorização:

- Pode afectar os órgãos sangue após exposição prolongada ou repetida.
- Manter afastado da roupa e de outras matérias combustíveis.
- Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Armazenar em recipiente fechado.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Eliminar o conteúdo em concordância com a regulamentação nacional.
- Usar luvas de protecção.
- Em caso de indisposição, consulte um médico.

EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Tel.: 800 250 250

ELEMENTOS DO RÓTULO



PERIGO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda **PT/DGS mrs012/2020**, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde)

EMBALAGENS

150 g

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:



18 rue des Remparts d'Ainay
69002 Lyon FRANÇA
Tel. 01420 80744

DISTRIBUÍDO POR:



Genyen - Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa - Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
Tel.: +351 211 581 669
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito por todas as indicações e recomendações, bem como pelas condições de aplicação nele apresentadas.