

## INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

O **RATRAX® SUPRA PELLETS** é um rodenticida anticoagulante (biocida - TP14), composto por 0,0025%(p/p) de brodifacume e 0,001% (p/p) de benzoato de denatônio, pronto a usar, sob a forma de pellets (vermelho) e destinado à utilização por profissionais (Uso Profissional).

Rodenticida para utilização em estações de isco invioláveis e rotuladas, no controlo de *Rattus norvegicus* (ratazana-castanha ou ratazana-comum ou ratazana-dos-esgotos) e *Mus musculus* (rato-caseiro ou rato-doméstico), adultos e juvenis, por utilizadores profissionais, em áreas interiores de edifícios e em áreas exteriores (ao redor de edifícios).

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

### INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

#### Utilização em áreas interiores

Para rato-doméstico, aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis.

Aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis, espaçadas de 5m (para infestações severas separadas cada 2m) nas áreas de actividade dos roedores.

O rato-doméstico é muito curioso e pode ajudar o programa de controlo, mover os iscos a cada 2-3 dias no momento em que os pontos de isco são inspeccionados ou reabastecidos. Fazer inspecções frequentes às estações de isco durante os primeiros 10-14 dias e substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade. Se em algumas zonas o isco foi comido, aumentar a quantidade de isco, colocando mais estações de isco. Não aumentar o tamanho do ponto de isco. Substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade.

Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m.

Aplicar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m (separadas por 5m em áreas de elevada infestação) em áreas de actividade dos roedores.

Verificar regularmente o consumo do isco e substituir o isco consumido ou estragado até que o consumo tenha parado. Repetir o tratamento em situações em que haja evidência de nova infestação (por exemplo, novas trilhos ou excrementos). Não mova ou perturbe os pontos de isco por vários dias após a colocação do isco.

Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover o isco para uma área de maior actividade dos roedores. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais pontos de isco. Não aumente o tamanho do ponto de isco. Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

As estações de isco devem ser verificadas apenas 5 a 7 dias após o início do tratamento e posteriormente pelo menos uma vez por semana, a fim de verificar se o isco é aceite, se as estações de isco estão intactas e remover os corpos de roedores. Reabastecer o isco quando necessário.

Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

#### Utilização em áreas exteriores, ao redor de edifícios

Para rato-doméstico, aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis.

Aplicar 5-20g de isco em estações de isco invioláveis, espaçadas de 5m (para infestações severas separadas cada 2m) nas áreas de actividade dos roedores. O rato-doméstico é muito curioso e pode ajudar o programa de controlo, mover os iscos a cada 2-3 dias no momento em que os pontos de isco são inspeccionados ou reabastecidos. Fazer inspecções frequentes às estações de isco durante os primeiros 10-14 dias e substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade. Se em algumas zonas o isco foi comido, aumentar a quantidade de isco, colocando mais estações de isco. Não aumentar o tamanho do ponto de isco. Substituir o isco comido pelos roedores, danificados por água ou contaminados por sujidade.

Para ratazanas, usar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas 10m.

Aplicar 10-60g de isco em estações de isco invioláveis espaçadas de 10m (separadas por 5m em áreas de elevada infestação) em áreas de actividade dos roedores. Verificar regularmente o consumo do isco e substituir o isco consumido ou estragado até que o consumo tenha parado. Repetir o tratamento em situações em que haja evidência de nova infestação (por exemplo, novas trilhos ou excrementos). Não mova ou perturbe os pontos de isco por vários dias após a colocação do isco. Caso não haja nenhum sinal de actividade das ratazanas próximo do isco após 7-10 dias, mover o isco para uma área de maior actividade dos roedores. Se todo o isco foi comido em certas áreas, aumente a quantidade de isco colocando mais pontos de isco. Não aumente o tamanho do ponto de isco. Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

Proteger o isco das condições atmosféricas (ex: chuva, neve, etc.). Coloque as estações de isco em áreas não sujeitas a inundações.

Substitua o isco comido por roedores, danificado por água ou contaminado por sujidade.

Quando o produto estiver a ser aplicado em áreas públicas, as áreas tratadas devem ser marcadas durante o período de tratamento e deve ser feito um aviso explicando o risco de envenenamento primário ou secundário pelo anticoagulante, bem como indicar as primeiras medidas a serem tomadas em caso de envenenamento, devendo ser disponibilizado ao lado dos iscos.

## OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

### Efeitos directos ou indirectos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

- Este produto contém uma substância anticoagulante. Em caso de ingestão, os sintomas (que podem demorar a manifestar-se) podem incluir hemorragia nasal e sangramento das gengivas. Em casos graves, podem surgir hematomas e a presença de sangue nas fezes ou na urina.
- Antídoto: Vitamina K1 administrada apenas por pessoal médico/veterinário.
- Em caso de contacto com a pele, lavar com água e depois com sabonete e água.
- Em caso de contacto com os olhos, enxaguar os olhos com água ou líquido para enxaguar os olhos, mantendo as pálpebras abertas pelo menos 10 minutos.
- Em caso de ingestão, enxaguar a boca com água. Nunca dê nada pela boca a uma pessoa inconsciente. Não provocar o vômito. Contacte o Centro de Informação Antivenenos ou um médico e mostre a embalagem ou o rótulo.
- Contactar um médico veterinário, em caso de ingestão por um animal de companhia.
- As estações de isco devem ser rotuladas com as seguintes informações: "não mover ou abrir"; "contém um rodenticida"; "nome do produto ou número de autorização"; "substância(s) ativa(s)" e "em caso de incidente, ligue para o **Centro de Informação Antivenenos (800 250 250)**.
- Perigoso para a vida selvagem.

### Outras informações

- Devido ao seu modo de acção retardado, os rodenticidas anticoagulantes podem levar de 4 a 10 dias para serem eficazes após o consumo efectivo do isco.
- Os roedores podem ser portadores de doenças. Não tocar nos roedores mortos directamente com as mãos. Utilizar luvas ou ferramentas (ex.: pinças) ao removê-los.
- Este produto contém um agente amargante e um corante.

### Precauções e condições especiais de autorização:

- Pode afectar os órgãos (sangue) após exposição prolongada ou repetida.
- Não respirar poeiras.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Armazenar em recipiente fechado.
- Eliminar o conteúdo em concordância com a regulamentação nacional.
- Em caso de indisposição, consulte um médico.

**EM CASO DE INGESTÃO: Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS (CIAV) - Tel.: 800 250 250**

### ELEMENTOS DO RÓTULO



**PERIGO**

**AUTORIZAÇÃO DE VENDA**

Autorização de venda **PT/DGS bbs-110/2020**, concedida pela DGS (Direcção-Geral da Saúde)

**EMBALAGENS**

3, 5, 10, 20 Kg

**DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:**



18 rue des Remparts d'Ainay  
69002 Lyon FRANÇA  
Tel. 01420 80744

**DISTRIBUÍDO POR:**



Genyen - Grow and Protect, S.A.  
Edifício Inovisa - Tapada da Ajuda  
1349-017 Lisboa  
Tel.: +351 211 581 669  
[www.genyen.pt](http://www.genyen.pt)

**As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito por todas as indicações e recomendações, bem como pelas condições de aplicação nele apresentadas.**