INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Grânulos dispersíveis em água (WG) com 80% (p/p) de enxofre

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

O **SOUF® Pallarés 80 WG** é um fungicida que actua por libertação de vapores de enxofre, com acção preventiva e curativa. O enxofre apresenta também acção secundária acaricida sobre diversas espécies fitófagas, permitindo por isso diminuir os efeitos de acarioses, e em particular da erinose.

Devido às excelentes características da sua formulação, o **SOUF® Pallarés 80 WG** apresenta:

- Grande capacidade de dispersão na água, dando origem a uma calda bastante homogénea;
- Ausência de formação de pó, representando grande vantagem e segurança para o aplicador;
- Partículas com elevada homogeneidade;
- Maior e melhor adsorção do produto nos tecidos das plantas, o que permite evitar o arrastamento do produto 2 horas após a aplicação;
- Boa persistência de acção que pode atingir os 10 dias.

FINALIDADES

O **SOUF® Pallarés 80 WG** está indicado no combate a oídio e escoriose em videira, pedrado da macieira e da pereira, oídio da macieira, damasqueiro, pessegueiro, ervilheira, meloeiro, morangueiro, pepino e tomateiro.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

UTILIZAÇÕES, CONCENTRAÇÕES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

Oídio da Videira: 400-1250 g/hl.
Em condições favoráveis e em vinhas de castas reconhecidas localmente como muito sensíveis ao oídio, usar apenas no período pré-floral.
O uso do produto na concentração mais elevada pode eventualmente dar origem à ocorrência de fitotoxicidade.

Escoriose da Videira: 400-500 g/hl.
Efectuar dois tratamentos na Primavera, o primeiro no estado fenológico botão de algodão – ponta verde – e o segundo da saída das folhas às folhas livres.

Pedrado da Pereira e Macieira: 600-700 g/hl no período pré-floral e 400 g/hl após a floração.
Seguir as indicações do Serviço de Avisos. Iniciar as aplicações ao aparecimento da ponta verde das folhas e repetir no estado de botão branco ou rosa usando as concentrações mais elevadas. Os tratamentos durante a floração só serão efectuados em cultivares em que esta se prolongue por largo período de tempo ou perante condições climáticas favoráveis à evolução da doença.
Repetir à queda das pétalas, ao vingamento do fruto e com intervalos de 10-12 dias em condições climáticas favoráveis à doença, usando a concentração mais baixa.
Pode provocar fitotoxicidade em plantas sensíveis ao enxofre, como por exemplo pereiras da cultivar "Anjou" e "Comice", macieiras das cultivares "Golden Delicious" e "Jonathan".
Não usar em fruta destinada à transformação industrial.
Não aplicar nas horas de maior calor.

Oídio da Macieira: 350 g/hl.
Realizar as aplicações ao abrolhamento. Repetir com 7-10 dias de intervalo ou em pomares muito atacados, de 5 em 5 dias, até ao fim do crescimento dos rebentos.

Oídio do Damasqueiro e Pessegueiro: 200-400 g/hl.
Iniciar as aplicações após a floração usando a concentração mais elevada.
Realizar aplicações com intervalos de 10-15 dias utilizando a concentração mais baixa.

Oídio da Ervilheira: 150-200 g/hl.
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentarem 3-5 folhas definitivas. Se necessário, repetir com intervalos de 2-3 semanas.

Oídio do Meloeiro: 300-350 g/hl.
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentarem 3-5 folhas definitivas. Se necessário, repetir com intervalos de 2-3 semanas.
As cucurbitáceas são especialmente sensíveis, pelo que a aplicação pode provocar sintomas de fitotoxicidade.

Oídio do Morangueiro: 200 g/hl.

® Marca Registada da Genyen – Grow and Protect, S.A.

Iniciar as aplicações após o aparecimento dos primeiros sintomas, em condições favoráveis à doença.

Oídio do Pepino: 200-300 g/hl.
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentarem 3-5 folhas definitivas. Se necessário, repetir com intervalos de 2-3 semanas.
As cucurbitáceas são especialmente sensíveis, pelo que a aplicação pode provocar sintomas de fitotoxicidade.

Oídio do Tomateiro: 200-400 g/hl.
Iniciar as aplicações quando as plantas apresentarem 3-5 folhas definitivas. Se necessário, repetir com intervalos de 2-3 semanas.

Precauções biológicas

- Evitar fazer aplicações nas horas de maior calor.
- Respeitar um intervalo de 3 semanas entre a aplicação de calda oleosa e a deste produto.

Incompatibilidade

- O produto não deve ser misturado com caldas oleosas.

Informações importantes

Precauções Toxicológicas, Ecotoxicológicas e Ambientais

- Ficha de segurança fornecida a pedido de utilizadores profissionais.
- Evitar respirar os vapores.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização.
- Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção facial.
- Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem. (Não limpar o equipamento de aplicação perto de águas de superfície./Evitar contaminações pelos sistemas de evacuação de águas das explorações agrícolas e estradas.)
- **EM CASO DE INTOXICAÇÃO, CONTACTAR O CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS, TELEF.: 808 250 143**

Intervalo de Segurança

Intervalo de segurança: Não aplicável

Classificação do Produto

Isento de classificação.

Autorização de Venda

Autorização provisória de venda n.º 4018, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

Embalagens

400g; 1kg; 25Kg.

Modos de produção sustentável

- O **SOUF® PALLARÉS 80 WG** pode ser usado em **Modo de Produção Biológico** (MPB), em conformidade com o Anexo II do Regulamento (CE) nº 889/2008, de 05 de Setembro, que estabelece as normas de execução do Regulamento (CE) n.º 834/2007 do Conselho, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, no que respeita à produção biológica, à rotulagem e ao controlo.

Detentor da Autorização de Venda:

Azufrera y Fertilizantes Pallarés, S.A.
P.I. Constantí, Avda Europa 1-7
43120 Constantí (Tarragona), ESPANHA
Tel.: +34 977 524 650

® Marca Registada da Genyen – Grow and Protect, S.A.

DISTRIBUÍDO POR:

genyen GROW AND PROTECT

Genyen – Grow and Protect, S.A.
Edifício Inovisa – Tapada da Ajuda
1349-017 Lisboa
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de aplicação nele expressas.

® Marca Registada da Genyen – Grow and Protect, S.A.