

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

FORMULAÇÃO E COMPOSIÇÃO:

Trichoderma asperellum estirpe TV1, 2.8% (1 x10¹⁰ cfu/kg) em forma de pó molhável (WP)

CARACTERÍSTICAS / MODO DE ACÇÃO

TRIAPUR contém *Trichoderma asperellum* estirpe TV1, fungo de ocorrência natural nos solos, competindo por espaço e recursos perante outros fungos.

O *Trichoderma asperellum* estirpe TV1 é um fungo antagonista dotado de uma elevada competitividade, tanto pela sua capacidade de colonizar os espaços e meios de cultura, como pela defesa dos recursos, em comparação com outros organismos do solo. Estas características, associadas a uma grande capacidade de adaptação a diversas condições edafoclimáticas, situam-no como o antagonista ideal no controle de fungos que atacam a raiz em todos os tipos de culturas, especialmente culturas hortícolas, colza, tabaco, plantas aromáticas e relvados.

FINALIDADES

A sua utilização está indicada para o controlo de doenças de solo em culturas hortícolas, colza, tabaco, plantas aromáticas e também relvados.

CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

CONDIÇÕES, DOSES E ÉPOCA DE APLICAÇÃO

Condições de utilização autorizadas:

Cultura	Doença	Dose	Volume da calda	I.S. (dias)
- culturas hortícolas ¹⁾ (ar livre ou estufa) - colza - tabaco - plantas aromáticas ¹⁾ (ar livre ou estufa) - relvados	Murchidão das-plântulas: <i>Pythium</i> spp. <i>Phytophthora</i> spp. <i>Rhizoctonia</i> spp. <i>Verticillium</i> spp.	5,0 Kg/ha	1000 L/ha	Não se aplica

1) **Culturas hortícolas e plantas aromáticas autorizadas:** alho, espargos, alcachofra, acelga, cenoura, cerefólio-de-raiz, pepino, chicória -de-café, cebola, melancia, agrião-de-sequeiro (=agrião-rinchão), cebolinho, feijoeiro, funcho, morangueiro, endívia (=chicória "witloof", chicória-de-Bruxelas), alface, alface-de-cordeiro (=canónigos), beringela, meloeiro, hortelã-comum, batateira, pimenteiro, tomateiro, alho-porro (=alho-francês), nabo, ervilheira, rúcula, salva, escarola (=chicória-frisada, chicória-de-folha larga), aipo (caule), espinafre, tomilho, abóbora (abóbora-porqueira), aboborinha (= "courgette").
Pimenteiro cayenne (=piri-piri, malagueta), agrião (=mastruço, agrião-mouro)

UTILIZAÇÕES MENORES (ao abrigo do artigo 51.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009)

Cultura	Doença	Dose	Volume de calda	I.S. (dias)
Abóbora (abóbora-almiscarada, Abóbora-manteiga) (ar livre ou estufa)	Murchidão das-plântulas: <i>Phytophthora</i> sp., <i>Pythium</i> sp., <i>Rhizoctonia</i> sp., <i>Verticillium</i> sp.)	5,0 kg/ha	1000 L/ha	Não se aplica
Abóbora (abóbora-cabaça) (ar livre ou estufa)				
Abóbora (abóbora-chila) (ar livre ou estufa)				
Abóbora (abóbora-menina) (ar livre ou estufa)				

A eficácia e fitotoxicidade resultantes destas utilizações menores são da inteira responsabilidade do utilizador do produto fitofarmacêutico

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS / COMPATIBILIDADE

- TRIAPUR® é geralmente compatível com outras substâncias activas, excepto oxadiazão, pendimentalina, azoxistrobina, penconazol, tirame.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicar de forma preventiva, por pulverização dirigida no solo, antes da instalação da cultura (pré ou no momento da sementeira ou transplante). Uma única aplicação por cultura no máximo. Utilizar bicos de aplicação de diâmetro igual ou superior a 0.9 mm.

MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA

Na preparação da calda deitar metade do volume de água adequado para a pulverização prevista. Deitar a quantidade de produto necessária e completar o volume de água pretendido, assegurando agitação contínua.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES**CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E RESTRIÇÕES**

- Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Manter em local seco, ventilado e protegido dos raios solares.
- O produto pode ser armazenado durante 12 meses, a uma temperatura não superior a 30 °C.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS**ATENÇÃO****Microrganismos tem o potencial de provocar reações de sensibilização****UFI: U18F-1DJS-RX0A-KN78**

Ler o rótulo antes da utilização.

- **Ficha de segurança fornecida a pedido.**
- Não respirar as poeiras, nem a nuvem de pulverização.
- Evitar o contacto durante a gravidez e o aleitamento.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vómito.
- SE ENTRAR EM CONTATO COM A PELE: lavar suavemente com sabonete e água abundantes.
- SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Eliminar o conteúdo e embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

Contém *Trichoderma asperellum* estirpe TV1. Os microorganismos podem provocar uma reação alérgica.

Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250

O aplicador deverá usar luvas, vestuário de proteção e proteção facial durante preparação da calda e aplicação do produto.

INTERVALO DE SEGURANÇA

INTERVALO DE SEGURANÇA: Não aplicável.

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO

AUTORIZAÇÃO DE VENDA

Autorização de venda n.º 2217, concedida pela DGAV (Direcção-Geral de Alimentação e Veterinária)

EMBALAGENS

1 Kg.



MODOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

- O **TRIAPUR®** pode ser usado em **Modo de Produção Biológico (MPB)**, em conformidade com os Regulamentos (UE) n.º 2018/848 e (UE) n.º 2021/1165 do Conselho.

DETENTOR DA AUTORIZAÇÃO DE VENDA:

XEDA Italia S.r.l.
Via Filippo Guarini, 15
47121 Forli (FC)
ITALIA

DISTRIBUIDOR:



LAINCO S.A.
Avda. Bizet 8-12 (Pol. Ind. Can Jordi)
08191 Rubí (Barcelona), ESPANHA

DISTRIBUIDOR EM PORTUGAL:



GENYEN – Grow and Protect, S.A.
Rua 25 de Abril, Loural, Casal Novo
2665-247 Malveira, PORTUGAL
Tel.: +351 211 581 669
www.genyen.pt

As informações contidas neste documento não dispensam a leitura atenta do rótulo do produto e o respeito pelas condições de utilização e aplicação nele expressas.
